

# PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA (PICADURA DE ABEJA)

Nombre del Estudiante: \_\_\_\_\_ Fecha de Nac.: \_\_\_\_\_ Grado: \_\_\_\_\_ Salón: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono de Casa: \_\_\_\_\_

Nombre de la Madre: \_\_\_\_\_

Tel. del Trabajo: \_\_\_\_\_

Nombre del Padre: \_\_\_\_\_

Tel. Móvil: \_\_\_\_\_

Tel. del Trabajo: \_\_\_\_\_

Nombre del Doctor: \_\_\_\_\_

Tel. Móvil: \_\_\_\_\_

Tel. del Doctor: \_\_\_\_\_

Hospital: \_\_\_\_\_ Seguro Médico: \_\_\_\_\_

Póliza #: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**ALÉRGICO A:** Alergia Severa a Picaduras/Aguijones de Abejas

**ASMÁTICO:** Si\*  No  \*Alto riesgo a una reacción severa

**Señales de Emergencia:** LAS INDICACIONES DE UNA REACCIÓN ANAFILÁCTICA INCLUYEN:

<b>SISTEMAS:</b>	<b>SINTOMAS:</b>
BOCA	Comezón e hinchazón en los labios, lengua, o boca
GARGANTA	Comezón y/o la sensación de presión en la garganta, ronquera y tos seca
PIEL	Urticaria, salpullido con picazón, y/o hinchazón en la cara o en las extremidades
ESTÓMAGO	Náusea, dolor abdominal, vómito, y/o diarrea
PULMONES	Falta de aire, tos repetitiva, y/o respiración silbante
CORAZÓN	Pulso débil, desmayo

La severidad de los síntomas puede cambiar rápidamente. ¡CUALQUIERA DE LOS SÍNTOMAS DE ARRIBA puede progresar y convertirse en una situación de vida o muerte!

**Acción Que Debe Tomar el Maestro:** Permanecer con el estudiante

**QUE HACER CUANDO SE SOSPECHA QUE ES UNA PICADURA DE ABEJA**

1. Llamar a la oficina para pedir ayuda y el medicamento, si el estudiante no puede ir a la oficina.
2. Si está afuera, alguien tiene que correr al salón más cercano, llamar a la oficina para pedir ayuda y que la oficina llame al 911.
3. Inyectar el Epi-Pen Jr. al costado del muslo superior, si hay señales de que la reacción está empeorando (dificultad para respirar, respiración con silbido, urticaria, enrojecimiento de cuello, estómago, etc., quemazón o rubor en la piel, agitación, irritabilidad, ansiedad severa, dolor de cabeza, mareo, desorientación. No es necesario quitarle la ropa.

VER AL OTRO LADO. **ANOTAR LA HORA EN QUE SE LE APLICÓ:** \_\_\_\_\_.

**QUÉ HACER CUANDO SE SABE QUE ES UNA PICADURA DE ABEJA:**

1. Quitar el aguijón con un pedazo de cartón duro, no usar pinzas.
2. Llamar a la oficina para pedir ayuda y el Epi-Pen. Pedir que la oficina llame al 911.
3. Inyectar el Epi-Pen al costado del muslo superior. No es necesario quitarle la ropa antes de poner la inyección. VER AL OTRO LADO. **ANOTAR LA HORA EN QUE SE LE APLICÓ:** \_\_\_\_\_.
4. Transportar a la Sala de Urgencias (Hospital el Camino).

¡NO DUDE EN DAR EL MEDICAMENTO O LLAMAR AL 911, aún si no se puede contactar al padre o al doctor!

\*\*\*\*\*

**DOY MI AUTORIZACION PARA QUE ESTA INFORMACION SEA COMPARTIDA CON EL PERSONAL DE LA ESCUELA.**

Firma del Padre/Madre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Firma de la Enfermera Escolar: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Firma del Director (a): \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Firma del Maestro (a): \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_